# 令和4年度版
# 予防接種の予定

≪お問い合わせ≫
新冠町役場　保健福祉課　保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ
健康推進係　保健師
TEL：０１４６－４７－２１１３

## □ 予防接種って？

赤ちゃんや子どもは、大人のように、病気に対する抵抗力が完全にできあがっていません。
そのため感染症にかかると、大人では考えられないような重い症状になることがあります。
赤ちゃんや子どもが、病気にかからないために行うのが予防接種です。

## □ 予防接種を受ける前に知っておきたいこと

①

前日は、入浴させ、身体を清潔にしておきましょう！

②

接種日の朝は、子どもの状態をよく観察し、体調に変化がないか確認しましょう！

③

体調が悪いかな？と思ったら、次の機会に受けるようにしましょう！

④ 受ける予防接種の必要性や効果、副反応を確認してから行きましょう。母子手帳交付時にお渡ししている『予防接種と子どもの健康』という冊子をお読みください。

⑤ 当日持参する予診票は、お子さまの大切な資料となります。しっかりと記入して持参しましょう。

⑥ 母子手帳は予防接種の大事な記録張でもあります。当日は忘れず持参しましょう。



## 定期の予防接種スケジュール

### 定期接種の種類

（定期接種： 法律によって種類と接種対象が定められているもの（無料））

| 予防接種の種類 | 対象者 | 標準的な接種期間※ | 回数 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| **Hib**<br>**（インフルエンザ菌ｂ型）** | ２ヶ月～5 歳未満 | 右記①参照 | ①初回接種開始時期が２ヶ月～7 ヶ月の場合<br>初回:3 回<br>追加:1 回 | 27～56 日（4～8 週）※1<br>初回接種終了後、7～13 ヶ月あけて |

～接種開始時期によって接種回数が違います～

②初回接種開始時が７ヶ月～12 ヶ月の場合
初回:2 回を 27～56 日（4～8 週）間隔で※2
追加:1 回を初回接種終了後、7～13 ヶ月あけて

③初回接種開始時が 1 歳～5 歳未満の場合
1 回

※1：初回の２・３回目は１歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27 日以上の間隔をおいて１回行う。

※2：初回接種の２回目は１歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27 日以上の間隔をおいて１回行う。

<table>
<tr><th colspan="2">予防接種の種類</th><th>対象者</th><th>標準的な接種期間</th><th>回数</th><th>間隔</th></tr>
<tr><td colspan="2">小児用<br>肺炎球菌</td><td>２ヶ月～5 歳未満</td><td>右記①参照</td><td colspan="2">①初回接種開始時期が２ヶ月～7 ヶ月の場合<br>初回:3 回　27 日以上（4 週以上）※3<br>追加:1 回　初回接種終了後 60 日以上あけて<br>（標準として 12～15 ヶ月齢時）<br>～接種開始時期によって接種回数が違います～<br>②初回接種開始時が 7 ヶ月～12 ヶ月の場合<br>初回:2 回を 27 日以上（4 週以上）の間隔で※4<br>追加:1 回を初回接種終了後 60 日以上あけて<br>（標準として 12～15 ヶ月齢時）<br>③初回接種開始時が 1 歳～2 歳未満の場合<br>60 日以上あけて２回<br>④初回接種開始時が 2 歳～5 歳未満の場合<br>１回<br>※3：初回接種の２・３回目は２歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない（追加接種は可能）。<br>また、初回接種の２回目は１歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は初回接種の３回目は行わない（追加接種は可能）。<br>※4：初回接種の２回目は２歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない（追加接種は可能）。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">B 型肝炎</td><td rowspan="2">1 歳未満<br>※H28.4.1 生まれ以降</td><td rowspan="2">２ヶ月～9 ヶ月</td><td>初回:2 回</td><td>27 日以上</td></tr>
<tr><td>追加:1 回</td><td>第１回目の注射から 139 日以上<br>（20～24 週）あけて</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">四種混合<br>（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）</td><td rowspan="2">３ヶ月～<br>７歳６ヶ月未満</td><td>初回：３ヶ月～<br>１歳未満</td><td>３回</td><td>20～56 日（3～8 週）</td></tr>
<tr><td>追加：右記参照</td><td>１回</td><td>初回接種終了後、１年～1 年半あけて</td></tr>
<tr><td colspan="2">二種混合<br>（ジフテリア・破傷風）</td><td>１１歳～<br>１３歳未満</td><td>１１歳～１２歳</td><td>１回</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">BCG</td><td>１歳未満</td><td>５ヶ月～８ヶ月</td><td>１回</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">麻しん<br>風しん</td><td colspan="2">第１期：１歳～2 歳未満</td><td>１回</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第２期：５歳～7 歳未満<br>（小学校入学前年度の１年間）</td><td>１回</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水痘</td><td>１歳～3 歳未満</td><td>右記参照</td><td>２回</td><td>１歳～1 歳３ヶ月までに１回目、<br>１回目から 6～12 ヶ月あけて２回目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">日本脳炎</td><td rowspan="3">第１期：<br>６ヶ月～<br>７歳６ヶ月未満</td><td>初回：３歳以上<br>４歳未満</td><td>２回</td><td>6～28 日</td></tr>
<tr><td>追加：４歳以上<br>５歳未満</td><td>１回</td><td>初回接種終了後６ヶ月以上、概ね１年あけて</td></tr>
<tr><td>第２期：<br>９歳～13 歳未満</td><td>９歳以上<br>10 歳未満</td><td>１回</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">ロタウイルス※</td><td>1 価<br>（ロタリックス）</td><td>生後６週から<br>生後 24 週まで</td><td rowspan="2">初回接種については、<br>生後２ヶ月～<br>14 週６日まで</td><td>２回</td><td>27 日以上</td></tr>
<tr><td>5 価<br>（ロタテック）</td><td>生後６週から<br>生後 32 週まで</td><td>３回</td><td>27 日以上</td></tr>
</table>

※ロタウイルスは、R2.10.1～定期接種化。対象は R2.8.1 生まれ以降の者。

＊任意接種（全額自費）：おたふくかぜ（1 歳～1 回目、5～6 歳で２回目）

# 医療機関での予防接種の受け方について

下記の医療機関で接種をすることが出来ます。事前に予約が必要なので、各医療機関にお問い合わせください。

| 接種可能医療機関 | ワクチン名 | | | | | | | | | 同時接種※1について |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hib | 小児肺炎球菌 | B型肝炎 | 四種混合 | 麻しん風しん | 水痘 | 日本脳炎 | ロタウイルス 1価 | ロタウイルス 5価 | |
| 新冠町国保診療所 0146−47−2411 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | Hib・小児肺炎球菌・ロタウイルスの同時接種が可能 |
| 山田クリニック 0146−43−0008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Hib・小児肺炎球菌の同時接種が可能 |
| 日高徳州会病院 0146−42−0701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ワクチンの種類・数を問わず同時接種が可能 |
| 駒木クリニック 0146−45−0123 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |

※1：複数のワクチンを異なる部位（上腕、大腿等）に各々接種します。安全上の問題はないとされており、子ども本人や保護者の負担を軽減することができます。

## □ 異なる種類の予防接種を受ける場合の接種間隔について（R2.10.1～改訂）

- 注射生ワクチン　ＢＣＧ、麻しん風しん、水痘、（おたふくかぜ）
  - → ２７日以上あける → 注射生ワクチン
  - → 制限なし → 経口生ワクチン / 不活化ワクチン
- 経口生ワクチン　：　ロタウイルス
  - → 制限なし → 注射生ワクチン / 経口生ワクチン / 不活化ワクチン
- 不活化ワクチン　：　Hib、小児肺炎球菌、四種混合、二種混合、Ｂ型肝炎、日本脳炎
  - → 制限なし → 注射生ワクチン / 経口生ワクチン / 不活化ワクチン

## □ 予防接種を受けたら…